

コード	レジメン名	コメント	1サイクルあたりの日数	薬剤情報 薬品名:数量 投与日
onc0879	フルオロウラシル+MMC(肛門管癌、CRT)		28	マイトマイシン注【2mg】:10mg/㎡ Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):1000mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4
onc0993	(臨床試験)ラムシルマブ+sLV5FU(WJOG 9216G)維持療		14	フルオロウラシル注(250mg/1000mg):3200mg/㎡ Day1 レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/㎡ Day1 サイラムザ点滴静注液(100mg/500mg):8mg/kg Day1
onc1554	(大腸癌)初回トラスツズマブ+ペルツズマブ		21	バージェタ点滴静注 420mg (14mL/V):840mg Day1 ハーセプチン注射用 150mg:8mg/kg Day1
onc1555	(大腸癌)維持トラスツズマブ+ペルツズマブ -		21	バージェタ点滴静注 420mg (14mL/V):420mg Day1 ハーセプチン注射用 150mg:6mg/kg Day1
onc1651	bi-weekly セツキシマブ+FOLFOX		14	アービタックス注射液100mg(20mL/V):500.0mg/㎡ Day1 【毒】オキサリプラチン点滴静注液 100mg「NK」(20mL/V):85.0mg/㎡ Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):2400.0mg/㎡ Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):400.0mg/㎡ Day1 レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200.0mg/㎡ Day1
onc1652	bi-weekly セツキシマブ+FOLFIRI		14	アービタックス注射液100mg(20mL/V):500.0mg/㎡ Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):2400.0mg/㎡ Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):400.0mg/㎡ Day1 イリノテカン点滴静注(40mg/100mg):150.0mg/㎡ Day1 レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200.0mg/㎡ Day1
onc1719	(大腸癌) フェスゴ (維持)		21	フェスゴ配合皮下注MA:10.0mL Day1
sur0170	ペバシズマブ+FOLFOX		14	ペバシズマブBS点滴静注 (100mg/400mg):5mg/kg Day1 レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/㎡ Day1 オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):85mg/㎡ Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):400mg/㎡ Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):2400mg/㎡ Day1
sur0172	FOLFOX		14	フルオロウラシル注(250mg/1000mg):2400mg/㎡ Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):400mg/㎡ Day1 オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):85mg/㎡ Day1 レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/㎡ Day1
sur0175	(初回)セツキシマブ		14	アービタックス注射液100mg(20mL/V):400mg/㎡ Day1 アービタックス注射液100mg(20mL/V):250mg/㎡ Day8
sur0184	ペバシズマブ+sLV5FU2		14	フルオロウラシル注(250mg/1000mg):2400mg/㎡ Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):400mg/㎡ Day1 レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/㎡ Day1 ペバシズマブBS点滴静注 (100mg/400mg):5mg/kg Day1
sur0188	FOLFOX (末梢持続)		14	レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/㎡ Day1 オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):85mg/㎡ Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):400mg/㎡ Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):1200mg/㎡ Day1 Day2
sur0189	XELOX	ゼローダ:2000mg/m2/day (14日投与7日休み)	21	オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):130mg/㎡ Day1
sur0190	ペバシズマブ+XELOX	ゼローダ:2000mg/m2/day (14日投与7日休み)	21	オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):130mg/㎡ Day1 ペバシズマブBS点滴静注 (100mg/400mg):7.5mg/kg Day1
sur0192	パニツムマブ+sLV5FU2		14	ベクティビックス点滴静注 100mg (5mL/V):6mg/kg Day1 レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/㎡ Day1

				フルオロウラシル注(250mg/1000mg):2400mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):400mg/m ² Day1
sur0195	(初回)セツキシマブ+FOLFOX	初回のみ使用 新規複写禁止	14	レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):400mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):2400mg/m ² Day1 アービタックス注射液100mg(20mL/V):400mg/m ² Day1 オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):85mg/m ² Day1 アービタックス注射液100mg(20mL/V):250mg/m ² Day8
sur0196	(維持)セツキシマブ+FOLFOX		14	レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):400mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):2400mg/m ² Day1 オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):85mg/m ² Day1 アービタックス注射液100mg(20mL/V):250mg/m ² Day1 Day8
sur0197	(初回)セツキシマブ+FOLFOX(末梢持続)	初回のみ使用 新規複写禁止	14	レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/m ² Day1 オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):85mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):400mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):1200mg/m ² Day1 Day2 アービタックス注射液100mg(20mL/V):400mg/m ² Day1 アービタックス注射液100mg(20mL/V):250mg/m ² Day8
sur0198	(維持)セツキシマブ+FOLFOX(末梢持続)		14	レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/m ² Day1 オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):85mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):400mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):1200mg/m ² Day1 Day2 アービタックス注射液100mg(20mL/V):250mg/m ² Day1 Day8
sur0201	パニツムマブ+FOLFOX(末梢持続)		14	ベクティビックス点滴静注 100mg (5mL/V):6mg/kg Day1 レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):400mg/m ² Day1 オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):85mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):1200mg/m ² Day1 Day2
sur0545	CCOG1201B群(Beva+XELIRI)	ゼローダ:1600mg/m ² /day (14日投与7日休み)	21	イリノテカン点滴静注(40mg/100mg):200mg/m ² Day1 ベバシズマブBS点滴静注 (100mg/400mg):7.5mg/kg Day1
sur0621	SOX		21	オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):130mg/m ² Day1
sur0622	ベバシズマブ+SOX		21	ベバシズマブBS点滴静注 (100mg/400mg):7.5mg/kg Day1 オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):130mg/m ² Day1
sur0765	パニツムマブ+CPT-11		14	ベクティビックス点滴静注 100mg (5mL/V):6mg/kg Day1 イリノテカン点滴静注(40mg/100mg):150mg/m ² Day1
sur0833	SIRB(CPT-11+S-1+ベバシズマブ)	2nd-line以降で使用 FOLFIRIやXELIRIなどが忍容性がない場合に使用すること 開始基準 腎機能血清Cre 1.2以下もしくはCCr 50 mL/min以上のため注意	21	イリノテカン点滴静注(40mg/100mg):150mg/m ² Day1 ベバシズマブBS点滴静注 (100mg/400mg):7.5mg/kg Day1
sur0837	ramucirumab+FOLFIRI	切除不能進行・再発大腸癌の二次治療に使用Bev使用不可例など	14	フルオロウラシル注(250mg/1000mg):2400mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):400mg/m ² Day1 イリノテカン点滴静注(40mg/100mg):150mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/m ² Day1 サイラムザ点滴静注液 (100mg/500mg):8mg/kg Day1
sur0909	Aflibercept+FOLFIRI	切除不能進行・再発大腸癌の二次治療に使用Bev使用不可例など	14	ザルトラップ点滴静注 (100mg/200mg):4mg/kg Day1

				レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/m ² Day1 イリノテカン点滴静注(40mg/100mg):150mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):400mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):2400mg/m ² Day1
sur0921	(臨床試験)(維持)セツキシマブ+FOLFOX1	JACCROCC-13最大12サイクルまで以降、Cmab+5FU/LVで維持量法施行	14	フルオロウラシル注(250mg/1000mg):2400mg/m ² Day1 オキサリプラチン点滴静注 100mg (20mL/V):85mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/m ² Day1 イリノテカン点滴静注(40mg/100mg):150mg/m ² Day1 アービタックス注射液100mg(20mL/V):250mg/m ² Day1 Day8
sur0924	ペバシズマブ+FOLFOXIRI (末梢持続)	RAS変異患者に使用(RAS野生型については臨床試験レジメン使用を)	14	フルオロウラシル注(250mg/1000mg):1200mg/m ² Day1 Day2 オキサリプラチン点滴静注 100mg (20mL/V):85mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/m ² Day1 イリノテカン点滴静注(40mg/100mg):150mg/m ² Day1 ペバシズマブBS点滴静注 (100mg/400mg):5mg/kg Day1
sur0925	(臨床試験)(初回)セツキシマブ+FOLFOX1	JACCROCC-13最大12サイクルまで以降、Cmab+5FU/LVで維持量法施行	14	フルオロウラシル注(250mg/1000mg):1200mg/m ² Day1 Day2 オキサリプラチン点滴静注 100mg (20mL/V):85mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/m ² Day1 イリノテカン点滴静注(40mg/100mg):150mg/m ² Day1 アービタックス注射液100mg(20mL/V):400mg/m ² Day1 アービタックス注射液100mg(20mL/V):250mg/m ² Day8
sur1020	パニツムマブ+FOLFOX		14	レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):400mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):2400mg/m ² Day1 オキサリプラチン点滴静注 100mg (20mL/V):85mg/m ² Day1 ベクティビックス点滴静注 100mg (5mL/V):6mg/kg Day1
sur1109	FOLFOXIRI		14	イリノテカン点滴静注(40mg/100mg):150mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/m ² Day1 オキサリプラチン点滴静注 100mg (20mL/V):85mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):2400mg/m ² Day1
sur1774	FOLFOXIRI (末梢持続)		14	イリノテカン点滴静注(40mg/100mg):150.0mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200.0mg/m ² Day1 【毒】オキサリプラチン点滴静注 100mg「NK」(20mL/V):85.0mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):1200.0mg/m ² Day1 Day2
sur1812	セツキシマブ (bi-weekly)		14	アービタックス注射液100mg(20mL/V):500.0mg/m ² Day1
sur2169	ペバシズマブ+FOLFIRI		14	ペバシズマブBS点滴静注 (100mg/400mg):5mg/kg Day1 レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/m ² Day1 イリノテカン点滴静注(40mg/100mg):150mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):400mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):2400mg/m ² Day1
sur2171	FOLFIRI		14	レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/m ² Day1 イリノテカン点滴静注(40mg/100mg):150mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):400mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):2400mg/m ² Day1
sur2185	ペバシズマブ+FOLFIRI(末梢持続)		14	フルオロウラシル注(250mg/1000mg):1200mg/m ² Day1 Day2 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):400mg/m ² Day1 イリノテカン点滴静注(40mg/100mg):150mg/m ² Day1

				レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/m ² Day1 ペバシズマブBS点滴静注(100mg/400mg):5mg/kg Day1
sur2187	FOLFIRI(末梢持続)		14	レボホリナート点滴静注用:200mg/m ² Day1
				イリノテカン点滴静注(40mg/100mg):150mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):400mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):1200mg/m ² Day1 Day2
sur2193	パニツムマブ+FOLFIRI		14	ベクティビックス点滴静注 100mg(5mL/V):6mg/kg Day1 レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):400mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):2400mg/m ² Day1 イリノテカン点滴静注(40mg/100mg):150mg/m ² Day1
sur2202	(初回)セツキシマブ+FOLFIRI	初回のみ使用 新規複写禁止	14	レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/m ² Day1 イリノテカン点滴静注(40mg/100mg):150mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):400mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):2400mg/m ² Day1 アービタックス注射液100mg(20mL/V):400mg/m ² Day1 アービタックス注射液100mg(20mL/V):250mg/m ² Day8
sur9190	ペバシズマブ+内服抗がん剤用(3週用)	ゼローダ:2000mg/m ² /day(14日投与7日休み)TS-1:80mg/m ² (14日投与7日休み) ※内服との併用に使用 アバステン単剤では使用しない	21	ペバシズマブBS点滴静注(100mg/400mg):7.5mg/kg Day1
sur9191	ペバシズマブ+内服抗がん剤(2週用)	TS-1:80mg/m ² /日(14日内服14日休薬)ロンサーフ:70mg/m ² /日(5日内服2日休薬)()回繰り返し、()週休薬 ※内服との併用に使用 アバステン単剤では使用しない	14	ペバシズマブBS点滴静注(100mg/400mg):5mg/kg Day1