

コード	レジメン名	コメント	1サイクルあたりの日数	薬剤情報 薬品名:数量 投与日
neu0583	Beva(2w)		14	アバスタチン点滴静注用(100mg/400mg): 10mg/kg Day1
ped0348	ドセタキセル+ジェムザール	症例限定子宮筋肉腫などにも使用可	21 21	ゲムシタピン注(200mg/1000mg): 675mg/m ² Day1 Day8 ドセタキセル点滴静注用 (20mg/80mg): 70mg/m ² Day8
onc978	(メルケル細胞がん)アベルマブ		14	バベンチオ点滴静注 200mg(10mL/V): 10mg/kg Day1
oph0905	(悪性黒色腫)DTIC (1000mg/m2 monthly)	オブジーボやヤーボイでPDになった症例が適応	28	ダカルバジン注用 100mg: 1000mg/m ² Day1
oph0904	(悪性黒色腫)DTIC (250mg/m2*5days)	オブジーボやヤーボイでPDになった症例が適応	21	ダカルバジン注用 100mg: 250mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
onc0985	ニボルマブ+イピリムマブ		21 21	オブジーボ点滴静注【20mg】(2mL/V): 80mg Day1 ヤーボイ点滴静注 50mg (10mL/V): 3mg/kg Day1
onc0672	(悪性黒色腫 2W)ニボルマブ		14	オブジーボ点滴静注【240mg】(24mL/V): 240mg Day1
nep0775	エンドキサンパルス(2週毎)	IPなどの場合は2週用を使用すること	14	エンドキサン(100mg/500mg): 500mg/m ² Day1
nep0168	エンドキサンパルス(4週毎)		28	エンドキサン(100mg/500mg): 500mg/m ² Day1
onc1547	(原発不明がん)ニボルマブ	総コース数: 52サイクル(2年間)	14	オブジーボ点滴静注【240mg】(24mL/V): 240mg Day1
onc1285	(MSI-H 大腸がん)イピリムマブ+ニボルマブ	4サイクル後に判定し、SD以上かつ毒性が許容されればニボルマブ単剤 240mg/bodyを2週毎または、480mg/bodyの4週毎で継続	21 21	ヤーボイ点滴静注 50mg (10mL/V): 1mg/kg Day1 オブジーボ点滴静注【240mg】(24mL/V): 240mg Day1
onc1276	(MSI-H 大腸がん 4W)ニボルマブ		28	オブジーボ点滴静注【240mg】(24mL/V): 480mg Day1
onc1271	(MSI-H 大腸がん 2W)ニボルマブ		14	オブジーボ点滴静注【240mg】(24mL/V): 240mg Day1
onc1045	(MSI-H 3W)ペムブロリズマブ		21	キイトルーダ点滴静注【100mg】(4mL/V): 200mg Day1