

コード	レジメン名	コメント	1サイクルあたりの日数	薬剤情報 薬品名:数量 投与日
nep0168	エンドキサンパルス(4週毎)		28	エンドキサン(100mg/500mg):500mg/m ² Day1
nep0775	エンドキサンパルス(2週毎)	IPなどの場合は2週用を使用すること	14	エンドキサン(100mg/500mg):500mg/m ² Day1
neu0583	Beva(2w)		14	アバスチン点滴静注用(100mg/400mg):10mg/kg Day1
onc0672	(悪性黒色腫 2W)ニボルマブ		14	オブジーボ点滴静注【240mg】(24mL/V):240mg Day1
onc0985	ニボルマブ+イビリムマブ		21	オブジーボ点滴静注【20mg】(2mL/V):80mg Day1
			21	ヤーボイ点滴静注 50mg (10mL/V):3mg/kg Day1
onc1045	(MSI-H 3W)ベムプロリズマブ		21	キイトルーダ点滴静注【100mg】(4mL/V):200mg Day1
onc1271	(MSI-H 大腸がん 2W)ニボルマブ		14	オブジーボ点滴静注【240mg】(24mL/V):240mg Day1
onc1276	(MSI-H 大腸がん 4W)ニボルマブ		28	オブジーボ点滴静注【240mg】(24mL/V):480mg Day1
onc1285	(MSI-H 大腸がん)イビリムマブ+ニボルマブ	4サイクル後に判定し、SD以上かつ毒性が許容されればニボルマブ単剤240mg/bodyを2週毎または、480mg/bodyの4週毎で継続	21	ヤーボイ点滴静注 50mg (10mL/V):1mg/kg Day1
			21	オブジーボ点滴静注【240mg】(24mL/V):240mg Day1
onc1547	(原発不明がん)ニボルマブ	総コース数:52サイクル(2年間)	14	オブジーボ点滴静注【240mg】(24mL/V):240mg Day1
onc1821	TGP	アブレビタント併用	21	ゲムシタビン注(200mg/1000mg):800.0mg/m ² Day1 Day8 【毒】バクリタキセル注(30mg/100mg):80.0mg/m ² Day1 Day8 【毒】シスプラチン注(10mg/25mg/50mg):50.0mg/m ² Day1 Day8
onc1822	GOP	2-8コース	21	【毒】バクリタキセル注(30mg/100mg):80.0mg/m ² Day1 Day8 ゲムシタビン注(200mg/1000mg):800.0mg/m ² Day1 Day8
				【毒】オキサリプラチン点滴静注液 100mg 「NK」(20mL/V):130.0mg/m ² Day1
onc978	(メルケル細胞がん)アベルマブ		14	バベンチオ点滴静注 200mg(10mL/V):10mg/kg Day1
oph0904	(悪性黒色腫)DTIC (250mg/m2*5days)	オブジーボやヤーボイでPDIになった症例が適応	21	ダカルバジン注用 100mg:250mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
oph0905	(悪性黒色腫)DTIC (1000mg/m2 monthly)	オブジーボやヤーボイでPDIになった症例が適応	28	ダカルバジン注用 100mg:1000mg/m ² Day1
ped0348	ドセタキセル+ジェムザール	症例限定子宮筋肉腫などにも使用可	21	ゲムシタビン注(200mg/1000mg):675mg/m ² Day1 Day8
			21	ドセタキセル点滴静注用(20mg/80mg):70mg/m ² Day8