

コード	レジメン名	コメント	1サイクルあたりの日数	薬剤情報 薬品名:数量 投与日
gas0111	(胃癌)パクリタキセル weekly		28	パクリタキセル注(30mg/100mg):80mg/m ² Day1 Day8 Day15
gas0721	(胃癌)ラムシルマブ+パクリタキセル		28	サイラムザ点滴静注液(100mg/500mg):8mg/kg Day1 Day15 パクリタキセル注(30mg/100mg):80mg/m ² Day1 Day8 Day15
gas0722	(胃癌)ラムシルマブ		28	サイラムザ点滴静注液(100mg/500mg):8mg/kg Day1 Day15
gas0926	(胃癌)nab-PTX weekly	特生につき同意書取得必要	28	アブラキサン点滴静注用 100mg:100mg/m ² Day1 Day8 Day15
gas0960	(胃癌)ラムシルマブ+nabPTX	サイラムザはフィルター付きルート使用アブラキサンはフィルターなしルート使用	28	サイラムザ点滴静注液(100mg/500mg):8mg/kg Day1 Day15 アブラキサン点滴静注用 100mg:100mg/m ² Day1 Day8 Day15
onc0956	(胃癌)(初回)トラスツズマブ+FOLFOX	原則HER+XELOXやHER+XPが適応とならない患者(経口摂取不良患者など)に対してのみ使用することカンファレンス等で議論して使用すること	14	フルオロウラシル注(250mg/1000mg):2400mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):400mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/m ² Day1 オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):85mg/m ² Day1 トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:6mg/kg Day1
onc0957	(胃癌)(初回末梢静脈)トラスツズマブ+FOLFOX	原則HER+XELOXやHER+XPが適応とならない患者(経口摂取不良患者など)に対してのみ使用することカンファレンス等で議論して使用すること	14	フルオロウラシル注(250mg/1000mg):1200mg/m ² Day1 Day2 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):400mg/m ² Day1 オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):85mg/m ² Day1 トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:6mg/kg Day1 レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/m ² Day1
onc0958	(胃癌)(維持)トラスツズマブ+FOLFOX	原則HER+XELOXやHER+XPが適応とならない患者(経口摂取不良患者など)に対してのみ使用することカンファレンス等で議論して使用すること	14	フルオロウラシル注(250mg/1000mg):2400mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):400mg/m ² Day1 オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):85mg/m ² Day1 トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:4mg/kg Day1 レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/m ² Day1
onc1072	(胃癌)FLOT(末梢投与)	切除不能局所再発もしくは転移個数の限られた胃癌に対する導入化学療法術前4コース	14	レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/m ² Day1 オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):85mg/m ² Day1 ドセタキセル点滴静注用(20mg/80mg):50mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):2600mg/m ² Day1
onc1083	胃癌 FOLFOX (末梢投与)		14	レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/m ² Day1 オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):85mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):1200mg/m ² Day1 Day2 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):400mg/m ² Day1

onc1094	【臨床試験 TCOG GI-1601】胃がんCapeOx	化学療法未治療の高齢者切除不能進行・再発胃癌 PS:0または1、70歳以上登録期間:3年間 H28年7月 ~平成31年6月追跡期間:1.5年間 H31年7月~平成32 年12月登録基準:WBC 12000以下、Hb 8.0g/dL以上、 好中球 1500/mm ³ 以上、血小板 100000/mm ³ 以上、 T-Bil 1.5mg/dL以下、ASTおよびALT100以下(肝転移 例は施設基準上限の5倍まで)、血清クレアチニン 1.5mg/dL以下、クレアチニンクリアランス 50mL/min以 上除外基準(一部抜粋):CIPN grade1以上ある患者、 ワーファリン、フェニトイン投与患者、HBs抗原陽性患者 などオキサリプラチン:後発薬品使用不可(エルブラット 臨時採用で使用) Ver2.0 L-OHP 100mg/m ² にプロ トコール改訂ゼローダ(カペシタビン)は、day1夕から開 始し、day15朝まで服用	21	エルブラット点滴静注液 100mg (20mL/V):100mg/m ² Day1
onc1268	(胃癌)トラスツズマブ デルクステカン	HER2陽性 3次治療以降(2020/10)	21	エンハーツ点滴静注用 100mg:6.4mg/kg Day1
onc1405	(胃癌)SOX (L-OHP130mg/m ²)+Nivo	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 40mg/m ² と併用	21	オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):130mg/m ² Day1 オブジーボ点滴静注【240mg】(24mL/V):240mg Day1 オブジーボ点滴静注【120mg】(12mL/V):120mg Day1
onc1407	(胃癌)FOLFOX (末梢持続)+Nivo		14	オブジーボ点滴静注【240mg】(24mL/V):240mg Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):1200mg/m ² Day1 Day2 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):400mg/m ² Day1 オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):85mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/m ² Day1
onc1408	(胃癌)FOLFOX +Nivo		14	レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/m ² Day1 オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):85mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):400mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):2400mg/m ² Day1 オブジーボ点滴静注【240mg】(24mL/V):240mg Day1
onc1409	(胃癌)G-SOX (L-OHP100mg/m ²)+Nivo	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 40mg/m ² と併用	21	オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):100mg/m ² Day1 オブジーボ点滴静注【240mg】(24mL/V):240mg Day1 オブジーボ点滴静注【120mg】(12mL/V):120mg Day1
onc1462	(胃癌)(維持末梢静脈)トラスツズマブ+FOLFOX	原則HER+XELOXやHER+XPが適応とならない患者 (経口摂取不良患者など)に対してのみ使用すること カンファレンス等で議論して使用すること	14	フルオロウラシル注(250mg/1000mg):1200mg/m ² Day1 Day2 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):400mg/m ² Day1 オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):85mg/m ² Day1 トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:4mg/kg Day1 レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/m ² Day1
onc1557	(胃癌)DOS	局所進行胃癌術前3コース	14	オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):100mg/m ² Day1 ドセタキセル点滴静注用(20mg/80mg):50mg/m ² Day1
sur0228	(胃癌)ドセタキセル+S-1	S-1は2投1休	21	ドセタキセル点滴静注用(20mg/80mg):40mg/m ² Day1

sur0681	(胃癌)(維持)トラスツズマブ	HER+XP療法、HER+SP療法のCDDP中止後に使用。 HERは維持量。	21	トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:6mg/kg Day1
sur0682	(胃癌)SOX(L-OHP100mg/m ²)		21	オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):100mg/m ² Day1
sur0685	(胃癌)(初回)トラスツズマブ+SP	S-1は2投1休	21	トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:8mg/kg Day1 シスプラチン注(10mg/25mg/50mg):60mg/m ² Day1
sur0686	(胃癌)(維持)トラスツズマブ+SP	S-1は2投1休	21	トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:6mg/kg Day1 シスプラチン注(10mg/25mg/50mg):60mg/m ² Day1
sur0834	(胃癌)SOX(L-OHP130mg/m ²)	臨床試験 KSCC1501A オキサリプラチン 130mg/m ² ※標準は胃癌では100mg/m ² (開始基準)WBC ≤12000, PLT ≥100000, 好中球 ≥1500 等プロトコール参照のこと	21	オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):130mg/m ² Day1
sur0931	(胃癌)ニボルマブ	治癒切除不能な進行・再発胃癌患者が対象。3次治療 以降で使用。	14	オプジーボ点滴静注【240mg】(24mL/V):240mg Day1
sur1103	TROX A群 トラスツズマブ+SOX(初回)	エスワン:後発品可 day1夕～day15朝まで内服	21	オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):130mg/m ² Day1 トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:8mg/kg Day1
sur1104	TROX A群 トラスツズマブ+SOX(維持)	エスワン:後発品可 day1夕～day15朝まで内服トラス ツズマブBS:2回目以降の投与が予定日(21日サイク ル)より、1週間を超えて投与する場合は8mg/kgで投 与。以降は6mg/kgで投与。 緊急採用 薬	21	オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):130mg/m ² Day1 トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:6mg/kg Day1
sur1157	(胃癌)FOLFOX		14	フルオロウラシル注(250mg/1000mg):2400mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(250mg/1000mg):400mg/m ² Day1 オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):85mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用(25mg/100mg):200mg/m ² Day1
sur1275	(胃癌 4W)ニボルマブ	治癒切除不能な進行・再発胃癌患者が対象。3次治療 以降で使用。	28	オプジーボ点滴静注【240mg】(24mL/V):480mg Day1
sur2215	(胃癌)イリノテカン		14	イリノテカン点滴静注(40mg/100mg):150mg/m ² Day1
sur871	(胃癌)(初回)トラスツズマブ+XELOX,SOX		21	オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):130mg/m ² Day1 トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:8mg/kg Day1
sur872	(胃癌)(維持)トラスツズマブ+XELOX,SOX		21	オキサリプラチン点滴静注液 100mg (20mL/V):130mg/m ² Day1 トラスツズマブBS点滴静注用【150mg】:6mg/kg Day1