

コード	レジメン名	コメント	1サイクルあたりの日数	薬剤情報 薬品名:数量 投与日
neu0734	ICE(脳リンパ腫、脳胚細胞腫瘍)		21	イホマイド注 1g:1.5g/m ² Day1 Day2 Day3 カルボプラチン注射液 150mg (15mL/V):300mg/m ² Day1 エトホシド点滴静注液 100mg (5mL/V):100mg/m ² Day1 Day2 Day3
onc1173	(腎癌 3W)ベムプロリズマブ+アキシチニブ	ベムプロリズマブは最大35サイクルIMDC risk は問われない	21	キイトルーダ点滴静注【100mg】(4ml/V):200mg Day1
onc1236	(腎癌)アベルマブ+アキシチニブ	IMDC risk は問われない	14	バベンチオ点滴静注 200mg(10mL/V):10mg/kg Day1
onc1258	(腎癌 6W)ベムプロリズマブ+アキシチニブ	ベムプロリズマブは最大35サイクル(3週毎)IMDC risk は問われない	42	キイトルーダ点滴静注【100mg】(4ml/V):400mg Day1
onc1316	(尿路上皮癌)アベルマブ	GC療法4~6コース後の維持療法30~60分前にカロナール400mgとボラミン1錠内服する。	14	バベンチオ点滴静注 200mg(10mL/V):10mg/kg Day1
onc1404	エンホルツマブベドチン	プラチナ製剤、抗PD-1抗体もしくは抗PD-L1抗体による治療が既治療の患者に使用する。末梢神経障害がGr2以上の患者は適格基準に含まれない	28	パドセブ点滴静注用 30mg:1.25mg/kg Day1 Day8 Day15
onc1553	(術後)ニボルマブ	総コース数:26サイクル (1年)	14	オブジーボ点滴静注【240mg】(24mL/V):240mg Day1
onc1581	(腎癌 3W)ベムプロリズマブ+レンパチニブ	レンパチニブ内服は20mg/日で開始	21	キイトルーダ点滴静注【100mg】(4ml/V):200mg Day1
onc1582	(腎癌 6W)ベムプロリズマブ+レンパチニブ	レンパチニブ内服は20mg/日で開始	42	キイトルーダ点滴静注【100mg】(4ml/V):400mg Day1
onc1791	EV+Pembro	ベムプロリズマブ35コースまで	21	パドセブ点滴静注用 30mg:1.25mg/kg Day1 Day8 キイトルーダ点滴静注【100mg】(4ml/V):200.0mg Day1
onc907	BEP (BLM day1, 8, 15)	BLMがday1,8,15	21	ブレオ注射用 5mg:30mg Day1 Day8 Day15 シスプラチン注(10mg/25mg/50mg):20mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 エトホシド点滴静注液 100mg (5mL/V):100mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
uro0391	EP		21	シスプラチン注(10mg/25mg/50mg):20mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 エトホシド点滴静注液 100mg (5mL/V):100mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
uro0510	トセタキセル (tri-weekly)		21	トセタキセル点滴静注用 (20mg/80mg):70mg/m ² Day1
uro0515	CBDDCA+GEM(尿路上皮癌)		21	ゲムシタピン注(200mg/1000mg):1000mg/m ² Day1 Day8 カルボプラチン注射液 150mg (15mL/V):AUC:5 Day1
uro0542	CBDDCA単回投与		21	カルボプラチン注射液 150mg (15mL/V):AUC:7 Day1
uro0663	weeklyPTX	二次治療以降で使用。	28	パクリタキセル注(30mg/100mg):80mg/m ² Day1 Day8 Day15
uro0778	cabazitaxel	対象疾患:去勢抵抗性前立腺がん目標コース数:最大10cycle20mg/m ² からの開始が推奨(特に高齢者では血液毒性が高いため)	21	ジェブタナ点滴静注 60mg:25mg/m ² Day1
uro0780	ddMVAC		14	メソトレキセート注 (200mg/1000mg):30mg/m ² Day1 シスプラチン注(10mg/25mg/50mg):70mg/m ² Day2 ドキソルピシン塩酸塩注射用(10mg/50mg):30mg/m ² Day2 エクザール注 10mg:3mg/m ² Day2
uro0836	(腎癌)ニボルマブ	(適応)・未治療の腎細胞がん治療でイピリムマブ+ニボルマブ4Cycle投与後の維持療法・2nd line以降での使用	14	オブジーボ点滴静注【240mg】(24mL/V):240mg Day1
uro0959	(尿路上皮癌 3W)ベムプロリズマブ	薬剤の納品に3営業日必要プラチナ治療で抵抗性となった患者が対象	21	キイトルーダ点滴静注【100mg】(4ml/V):200mg Day1
uro1255	(尿路上皮癌 6W)ベムプロリズマブ	薬剤の納品に3営業日必要プラチナ治療で抵抗性となった患者が対象	42	キイトルーダ点滴静注【100mg】(4ml/V):400mg Day1
uro1272	(腎癌 4W)ニボルマブ	(適応)・未治療の腎細胞がん治療でイピリムマブ+ニボルマブ4Cycle投与後の維持療法・2nd line以降での使用	28	オブジーボ点滴静注【240mg】(24mL/V):480mg Day1